Observation

n.° 16. Sur une tumeur au genou a l'occasion d'une fracture incomplette de la partie inferieure du femur

Dans le mois d'octobre de l'année 1732 un garçon de 18 a 20 ans, étant chargé d'un pesant fardeau fit un effort violent pour se garantir d'une chûtte dont il étoit menacé par un faux pas. Dans cet effort le pied droit tourna en dehors et dans l'instant il sentit une grande douleur a la partie inferieure et interne de la cuisse du même côté sans cependant que cette partie eut perdu la rectitude naturelle; Malgré la douleur il continua a marcher mais avec beaucoup de peine, et environ trois semaines après il fut obligé de garder le lit, parce qu'il parut une tumeur sur le condile interne du

ARC 39 n° 131

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

femur qui en moins de six semaines occupa ~~toute~~ toute la partie inferieure de la cuisse sans neanmoins aucune fluctuation : Les remedes generaux et particuliers ne furent point epargnés, mais sans succés, car le malade se trouva dans l'impuissance non-seulement de marcher mais même de se soutenir.

Aprés avoir resté dans cet etat environ deux mois, la tumeur de la cuisse diminua tout a coup, mais en même temps l'article du genou se trouva inondée, ce qui fut suivi de la perte totale du mouvement de cette partie. Les Douleurs augmenterent a proportion de la tumeur, et l'insomnie la fievre et le Devoyement qui s'y joignirent jetterent bientost le malade dans le dernier Epuisement

Ce fut dans cet Etat qu'on l'aporta a
l'hôtel-Dieu au commencement de Mars
1733; Après m'estre fait faire le
raport des choses cy dessus Enoncées
et considerant l'Etat present dela
Maladie je presumay qu'il n'y avoit
pas d'autres ressources que l'Amputation

Je la fis deux jours après, et dès la
nuit qui suivit l'operation le malade
dormit paisiblement, la fievre et le
devoyement ~~qui ne l'avoient point~~
~~quitté depuis plus de quatre mois~~
diminuerent a vue d'oeil, Et le Six.e
jour la supuration Etoit bien etablie
Enfin tous les accidens ayant
entierement cessés le malade guerit
en moins de trois mois.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

Par ladissection delapartie, j'observay

1.° Que les aponevroses des Muscles extenseurs dela Jambe etoient devenües dur Et calleuses ~~cartilagineuses~~ et qu'elles avoient aquis une epaisseur extraordinaire

2.° Après avoir fait une ouverture a lapartie latteralle interne du genou il en sortis beaucoup de pus sanguinolent : Je decouvris ensuitte lapartie inferieure du femur que je trouvay depouillé de son perioste dapres toute sa circonference, depuis l'attache du ligament Capsulaire jusqu'a trois travers de doigt au dessus des Condiles : La substance de l'os dans toute cette Etendüe, avoit perdu un tiers de son volume ; et cette perte etoit bornée par en haut par une exostose circulaire en forme de bourlet.

3.° Que le condile interne du femur etoit separé du corps de l'os de près de quatre lignes et que cette separation anticipoit jusqu'au tiers du condille externe; Le Ligament capsulaire etoit détaché par la partie posterieure entre les deux Condiles, cequi avoit favorisé la chûte de la matiere dans l'articule, qui par son sejour avoit deja detruit l'attache superieure de l'un des ligaments Croisés, sans cependant interesser les surfaces du tibia.

Reflexion

A quoy attribuer la cause d'une Carie, qui a detruit le tiers de la substance d'un os aussy dur, et aussy compacte que le femur?

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

c'est sans doute a l'effort que fis le jeune
homme pour ne pas tomber; je pense
qu'alors toute la violence de l'effort se
porta sur le condile interne du femur
et qu'elle fut assez grande pour le separer
du corps de l'os, et qu'ensuitte (la
maladie n'ayant pas eté connue) le
suc nourricier ayant lieu de s'echaper
par le defaut de reduction et par
l'absence du repos de la partie, il s'etoit
pratiqué une route du costé ou il
avoit trouvé le moins de resistance
entre le perioste et la substance de
l'os, et qu'en agissant sur l'un et
l'autre il les avoit detruits: c'est
aussy par les sels du suc nourricier que
les aponevroses qui envelopent la partie
inferieure de la cuisse se sont trouvés
si dures et si epaisses. Enfin si la table
du genou a eté garantie de la carie
ce n'est que parce que le ligament

capsulaire a resisté longtemps, et que d'ailleurs lorsque la matiere purulente la penetré, elle y a trouvé la sinovie qui a émoussé ses principes salins

Boudot

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

e N. 35